

Grille 2 Évaluation du risque de transmission du VIH en cas d'exposition sexuelle

RAPPORT SEXUEL NON PROTÉGÉ AVEC UNE PERSONNE SÉROPOSITIVE		FACTEURS AGGRAVANT LE RISQUE DE TRANSMISSION																																													
1. Anal réceptif* : ppa** [5 %–30 %]	Haut risque	– Infectiosité du partenaire (CD4<200, charge virale élevée, primo-infection, pathologie opportuniste en cours) – Infection et/ou lésion génitale chez la personne exposée ou son partenaire – Saignements au cours du rapport sexuel – Menstruations																																													
2. Vaginal réceptif : ppa [0,3 %–0,7 %]																																															
3. Vaginal insertif* : ppa [0,2 %–0,5 %]																																															
4. Anal insertif : ppa [0,1 %–1,85 %]																																															
5. Oral réceptif ou insertif avec ou sans éjaculation	Faible risque																																														
<p>PRÉALABLE : Rapport sexuel non protégé, accident de préservatif 48 heures Délai entre l'exposition et la consultation</p> <p>Ce délai doit être inférieur à 48 heures. Si le délai est supérieur à 48 heures, le médecin doit organiser un dépistage précoce de l'infection</p>																																															
<p>ÉVALUATION DU RISQUE ET RECOMMANDATIONS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Statut du partenaire</th> <th>Recommandations</th> <th>Commentaires</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. VIH +</td> </tr> <tr> <td>a. Rapport sexuel à haut risque</td> <td>Traitement conseillé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Rapport sexuel à faible risque</td> <td>Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. STATUT VIH INCONNU</td> </tr> <tr> <td>a. Homosexuel, bisexuel, et/ou usager de drogue injectable</td> <td>Encourager le partenaire à connaître son statut sérologique</td> <td>Arrêt du traitement si sérologie du partenaire s'avère négative</td> </tr> <tr> <td>• Rapport sexuel à haut risque</td> <td>Traitement conseillé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Rapport sexuel à faible risque</td> <td>Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Hétérosexuel multipartenaire et/ou originaire de zone à transmission hétérosexuelle prédominante***</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Rapport sexuel à haut risque</td> <td>Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Rapport sexuel à faible risque</td> <td>Pas de traitement</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Autre ou pas de renseignement</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Rapport sexuel à haut risque</td> <td>Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Rapport sexuel à faible risque</td> <td>Pas de traitement</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAS PARTICULIER : VIOL</td> <td>Considérer, en plus du type de rapport sexuel, les éléments spécifiques</td> <td>Eléments spécifiques : – traumatisme psychologique – lésions muqueuses associées</td> </tr> </tbody> </table>			Statut du partenaire	Recommandations	Commentaires	1. VIH +			a. Rapport sexuel à haut risque	Traitement conseillé		b. Rapport sexuel à faible risque	Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants		2. STATUT VIH INCONNU			a. Homosexuel, bisexuel, et/ou usager de drogue injectable	Encourager le partenaire à connaître son statut sérologique	Arrêt du traitement si sérologie du partenaire s'avère négative	• Rapport sexuel à haut risque	Traitement conseillé		• Rapport sexuel à faible risque	Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants		b. Hétérosexuel multipartenaire et/ou originaire de zone à transmission hétérosexuelle prédominante***			• Rapport sexuel à haut risque	Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants		• Rapport sexuel à faible risque	Pas de traitement		c. Autre ou pas de renseignement			• Rapport sexuel à haut risque	Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants		• Rapport sexuel à faible risque	Pas de traitement		CAS PARTICULIER : VIOL	Considérer, en plus du type de rapport sexuel, les éléments spécifiques	Eléments spécifiques : – traumatisme psychologique – lésions muqueuses associées
Statut du partenaire	Recommandations	Commentaires																																													
1. VIH +																																															
a. Rapport sexuel à haut risque	Traitement conseillé																																														
b. Rapport sexuel à faible risque	Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants																																														
2. STATUT VIH INCONNU																																															
a. Homosexuel, bisexuel, et/ou usager de drogue injectable	Encourager le partenaire à connaître son statut sérologique	Arrêt du traitement si sérologie du partenaire s'avère négative																																													
• Rapport sexuel à haut risque	Traitement conseillé																																														
• Rapport sexuel à faible risque	Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants																																														
b. Hétérosexuel multipartenaire et/ou originaire de zone à transmission hétérosexuelle prédominante***																																															
• Rapport sexuel à haut risque	Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants																																														
• Rapport sexuel à faible risque	Pas de traitement																																														
c. Autre ou pas de renseignement																																															
• Rapport sexuel à haut risque	Traitement à discuter si présence de facteurs aggravants																																														
• Rapport sexuel à faible risque	Pas de traitement																																														
CAS PARTICULIER : VIOL	Considérer, en plus du type de rapport sexuel, les éléments spécifiques	Eléments spécifiques : – traumatisme psychologique – lésions muqueuses associées																																													

* Rapport réceptif = avec pénétration par un partenaire atteint ; Rapport insertif = avec pénétration d'un(e) partenaire atteint(e).

** ppa = probabilité de transmission par acte.

*** Afrique sub-saharienne, Caraïbes, Asie du sud-est.

Source : Dossier d'aide à la décision de la prise en charge d'une exposition récente au VIH. CRIPS/DGS/InVS.